



CHIRURGIA MININVASIVA E DEL PAVIMENTO PELVICO

PREPARAZIONE COLONSCOPIA CON PLENVU PER PAZIENTI NON FAVICI (carenza 6 fosfato deidrogenasi)

Tre giorni prima dell'esame: non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo)

In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a 3 volte la settimana) aggiungere nei 5 giorni precedenti l'esame, due bustine al giorno di MOVICOL soluzione orale bustine 25 ML.

Il giorno prima dell'esame: si può consumare una colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. Si può bere nel pomeriggio ma la cena non è permessa. Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa.

Il giorno dell'esame non è permessa la colazione è consentita tuttavia l'assunzione di liquidi chiari fino a 3 ore prima dell'esame.

N.B. Poiché il prodotto ha un sapore molto dolce, a discrezione del paziente, si può aggiungere succo di frutta ACE (senza polpa) per rendere la soluzione più gradevole (fino a 150-200 cc per ogni soluzione di PLENVU da 500 cc).

Per il successo dell'esame, è tassativo eseguire scrupolosamente le indicazioni scritte sotto.

Per eventuali avvertenze nell'uso della preparazione o controindicazioni leggere il foglio illustrativo del prodotto o consultare il proprio medico. Si prega di presentarsi in clinica 30' prima dell'orario indicato per la registrazione. Venire accompagnati: è assolutamente sconsigliata la guida di veicoli per almeno 8 ore dopo la narcosi. Seguire la preparazione

Ai fini dell'esecuzione della sedazione è necessario portare in visione i seguenti esami:

emocromo, coagulazione, creatininemia. Elettrocardiogramma.



-Colonscopia programmata tra le ore 8 e le 14: il giorno prima dell'esame ore 20.00 –20.30 bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Fare pausa di un'ora e bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). La mattina è permesso bere acqua fino a due ore prima dell'inizio dell'esame.

-Colonscopia programmata dopo le ore 14: il giorno prima dell'esame ore 20.00 –20.30 bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Il giorno stesso dell'esame: 4 ore prima dell'inizio dell'esame bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Due ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

Come preparare le due dosi di **PLENVU**:

Dose 1



Tra il termine dell'assunzione della dose 1 e l'inizio dell'assunzione della dose 2 deve passare almeno 1 ora.

Dose 2

